

Ficha técnica de producto

Swirski-Mite

Amblyseius swirskii | Ácaro depredador

- Para el control de trips y mosca blanca
- Puede sobrevivir con polen u otras presas



Usar para

Plagas

Larvas jóvenes de varias especies de trips y huevos y ninfas de mosca blanca.

Cultivos

No usar en tomate.

Cómo funciona

Modo de acción

Los ácaros depredadores sujetan y perforan a sus presas con sus piezas bucales y succionan su contenido interno.

Apariencia

Los estadios móviles son ácaros beige con forma de gota. Los huevos son ovalados y de color blanco transparente. Los adultos miden alrededor de 0,5 mm. Los ácaros depredadores generalmente se encuentran en el envés de las hojas, a menudo en la inserción de la nervadura principal y las nervaduras laterales. No es posible distinguir *Amblyseius swirskii* en el campo de *Neoseiulus californicus*, *Amblyseius andersoni*, *Neoseiulus cucumeris*, *Transeius montdorens* o *Amblydromalus limonicus*.



Amblyseius swirskii huevos



Amblyseius swirskii adulto



Amblyseius swirskii depredando huevos de mosca blanca



[Ver video de control biológico de Swirski-Mite](#)

Especificaciones de producto

Tamaño del paquete

50.000 ácaros depredadores.

Presentación

Botella de 500 ml.

Etapa de desarrollo

Todos los estadios.

Sustrato

Salvado.

Alimento

Carpoglyphus lactis.

Instrucciones de uso

Aplicación

- Girar y agitar el frasco suavemente antes de usar
- Depositar el material sobre hojas o verter en Dibox
- Asegúrese de que el material permanezca en los puntos de suelta al menos durante varias horas tras la introducción
- También se puede aplicar con (Mini)-Air(o)bug



[Ver el video de aplicación de Swirski-Mite](#)

Dosis

La dosis de Montdo-Mite depende del clima, el cultivo y la densidad de plagas y siempre debe ajustarse a la situación particular. Iniciar la introducción en cuanto se detecten las primeras plagas en el cultivo. Las dosis de introducción suelen oscilar entre 25 y 300 por m² /introducción. Deben repetirse en caso necesario hasta que se logre el control. Consulte a un asesor de Koppert o a un distribuidor reconocido de productos de Koppert para obtener asesoramiento sobre la mejor estrategia para su situación.

Condiciones ambientales

Amblyseius swirskii es más eficaz a temperaturas entre 20 y 32 °C, resultando menos eficaz a temperaturas bajas. *Amblyseius swirskii* es sensible a humedades relativas muy bajas.

Uso combinado

No combinar con otros ácaros depredadores generalistas. Se puede combinar con *Orius* spp. y parasitoides de mosca blanca.

Efectos secundarios

Los plaguicidas pueden tener efectos (in)directos en las soluciones biológicas. Consulte [aquí](#) qué plaguicidas tienen efectos secundarios en este producto o en la app SideEffects (Apple Store y Google Play).

Manejo del producto

Tiempo de almacenamiento después de la recepción

1-2 días.

Temperatura de almacenamiento

12-14°C.

Condiciones de almacenaje

En la oscuridad, proporcione ventilación para evitar la acumulación de CO₂.

Notas

- Cuando la presa objetivo está ausente, *Amblyseius swirskii* también puede sobrevivir alimentándose de otras presas, como pequeños insectos, ácaros y polen
- Se puede proporcionar Nutari como alimento complementario para mejorar el establecimiento y aumentar el tamaño de la población de *Amblyseius swirskii*

Precautions

La aplicación de este producto puede provocar sensibilización o reacciones alérgicas, por lo que se aconseja tomar las precauciones necesarias.

Declaración de responsabilidad

Se aplican las condiciones generales de Koppert (Koppert B.V. y/o de sus empresas afiliadas).

Utilice únicamente productos que estén permitidos en su país/estado y cultivo. Consulte los requisitos de registro locales. Koppert no se hace responsable del uso no autorizado. Koppert no es responsable de ninguna pérdida de calidad si el producto se almacena durante más tiempo del recomendado y/o en condiciones incorrectas.